



**TUSMER ANLATTI,
TUS'TA SORULDU!**

**2025 SONBAHAR TUS
REFERANSLARIMIZ.**

ANATOMİ

Bizimle hazırlan, farkı yaşa!

Soru No: 4

Yirmi dört yaşındaki erkek hastanın göğüs duvarında, sol meme başının hemen altında apseleşmiş folikülit tespit ediliyor.

ÖSYM



Bu hastada gelişen enfeksiyonun aşağıdaki lenf düğümlerinden hangisine yayılması en az olasıdır?

- A) Nodi axillares anteriores
- B) Nodi axillares laterales
- C) Nodi infraclaviculares
- D) Nodi parasternales
- E) Nodi axillares apicales

Cevap Anahtarı: B

SAYFA 318

Nodi axillares



Soru No: 5


Kulak ağrısı şikâyetiyle başvuran erişkin hastanın otoskopik muayenesinde posterosuperior kadranda penetran yaralanmaya bağlı olarak membrana tympani'nin yırtıldığı ancak cavitas tympani oluşumlarının etkilenmediği saptanıyor.

Bu hastadaki klinik duruma yaralanan kulak ile aynı tarafta olmak üzere aşağıdaki fizik muayene bulgularından hangisinin eşlik etmesi en olasıdır?

- A) Yüzde sulcus nasolabialis'in silikleşmesi
- B) Gözde kuruluk
- C) Hiperakuzi
- D) Göz kırparken göz kapaklarının tam kapanmaması
- E) Dilin 2/3 ön kısmında tat duyusu kaybı

Cevap Anahtarı: E

SAYFA 550



Soru No: 6

Bir hafta önce kafa travması geçirdiği bilinen 15 yaşındaki hasta burun ve damakta kuruluk şikâyetiyle getiriliyor.

ÖSYM

Bu hastada aşağıdaki yapılardan hangisinin hasar görmüş olması en olasıdır?

- A) Ganglion oticum
- B) Ganglion submandibulare
- C) Ganglion pterygopalatinum
- D) Ganglion cervicale superior
- E) Ganglion ciliare

Cevap Anahtarı: C

SAYFA 544

Ganglion pterygopalatinum

- Fossa pterygoplatina'da, n. maxillaris'in altında yer alır. İşlevsel olarak n. facialis ile ilgilidir.
- Gl.lacrimalis, damak, yutak ve burun boşluğunda bulunan salgı bezlerine giden postganglionik parasempatik lifler bu gangliondan çıkar.


Soru No: 7

Aşağıdakilerden hangisi her iki akciğer ile komşuluk yapar?

- A) Oesophagus ve kalp
- B) Oesophagus ve vena cava superior
- C) Arcus aortae ve mide
- D) Arcus venae azygos ve kalp
- E) Mide ve vena cava inferior

Cevap Anahtarı: A

SAYFA 209



Mediastinal yüzde iz bırakan oluşumlar

Sağ	Sol
VCS	Arcus aortae
V. azygos	Aorta thoracica
Her iki akciğerde kalp ve oesophagus 'un izi vardır.	

Soru No: 8

Kırk yedi yaşındaki kadın hasta baş ağrısı, çarpıntı ve hipertansiyon şikâyetleriyle başvuruyor. Hastanın 24 saatlik idrar örneğinde vanil mandelik asit düzeyi yüksek bulunuyor. Üst abdominal bilgisayarlı tomografisinde sağ glandula suprarenalis'te sınırları belirgin kitle tespit ediliyor. Inferior uzanımı bulunmayan kitlenin bezin anteromedialinde bulunan komşu vasküler yapıya invazyon yaptığı görülüyor.

Bu hastada aşağıdakilerden hangisinde vasküler invazyon görülmesi en olasıdır?


- A) Arteria renalis dextra
- B) Vena portae hepatis
- C) Vena cava inferior
- D) Vena renalis dextra
- E) Arteria hepatica propria

Cevap Anahtarı: C

SAYFA 362

RETROPERİTONEAL ORGANLAR

- Aorta abdominalis ve dalları
- V. cava inferior
- Böbrek, üreter ve gl. suprarenalis
- Cisterna chyli
- Truncus sympathicus



Soru No: 11

Otuz iki yaşındaki hastaya penil fraktür şüphesiyle yapılan MRG'de crus penis yaralanmasına bağlı sınırlı hematom geliştiği belirleniyor.


Bu hastada hematomun aşağıdakilerden hangisinde sınırlı kalması en olasıdır?

- A) Recessus anterior fossae ischioanalıs
- B) Spatium extraperitoneale
- C) Spatium superficiale perinei
- D) Stratum adiposum superficiale
- E) Spatium profundum perinei

Cevap Anahtarı: C

SAYFA 167

Yüzeyel Perine Aralığı ♂



- Radix penis (bulbus penis ve crus penis)
- Spongioz uretra'nın proksimal bölümü

Soru No: 12

Servikal subaraknoid aralığa ulaşmak isteyen bir cerrah önden yaklaşarak epidural aralığa doğru girişim yapıyor.

ÖSYM



Bu hastada epidural aralıktan hemen önce geçilmesi beklenen en olası yapı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ligamentum longitudinale posterius
- B) Ligamentum longitudinale anterius
- C) Ligamenta flava
- D) Discus intervertebralis
- E) Ligamentum nuchae

Cevap Anahtarı: A

SAYFA 73

FASET EKLEMİN BAĞLARI



Soru No: 13

Transözofageal ekokardiyografi esnasında oesophagus ön duvarına en yakın görüntülenen lümenli yapı aşağıdakilerden hangisidir?



- A) Ventriculus dexter
- B) Ventriculus sinister
- C) Atrium dextrum
- D) Atrium sinistrum
- E) Aorta descendes

Cevap Anahtarı: D

SAYFA 220–221

Basis cordis

- Büyük bölümünü **sol atriyum** oluşturur
- Komşuluk yaptığı primer yapı **oesophagus**



ANATOMİ NOTUNDA CEVABI OLAN DİĞER SORULAR

Soru No: 26

Kafa travması geçiren bir hastada sağ gözün direkt ve indirekt ışık refleksi alınamıyor, sol gözün direkt ve indirekt ışık refleksi normal bulunuyor.


Bu hastadaki en olası hasar yeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Optik kiazma
- B) Sağ 2. kafa çifti
- C) Sağ 3. kafa çifti
- D) Sol 2. kafa çifti
- E) Sol 3. kafa çifti

Cevap Anahtarı: C

SAYFA 535

PUPILLA IŞIK REFLEKSİ



Soru No: 74

Aşağıdakilerden hangisinin özofagusun orta kısmındaki anatomik darlığa neden olması en olasıdır?

- A) Arcus aortae
- B) Vena azygos
- C) Ductus thoracicus
- D) Vena subclavia
- E) Nervus vagus


Cevap Anahtarı: A

SAYFA 348

OESOPHAGUS

4 yerde darlık gösterir

- **Başlangıcında**
(en dar olanı)
- **Arcus aortae**'yi
çaprazladığı yerde
- **Bronchus principalis sinister**'i
çaprazladığı yerde
- **Diaphragma**'dan geçtiği
yerde



Soru No: 85

Yirmi iki yaşındaki hasta bulanık görme şikâyetiyle başvuruyor. Hastanın bir hafta önce sağ orbitofrontal bölgeye yakın kafa travması geçirdiği öğreniliyor. Muayenesinde sağ pupilin sola göre dilate olduğu, sağ göze ışık tutulduğunda irisin bazı kısımlarının kontraksiyon gösterdiği ancak diğer kısımların göstermediği saptanıyor.

Bu hastada etkilenmiş olması en olası ganglion aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Siliyer
- B) Gasser
- C) Dorsal kök
- D) Genikulat
- E) Superior servikal

Cevap Anahtarı: A


SAYFA 529

Preganglionik parasempatik (PS) nöronların bulunduğu çekirdekler

- (1) Nuc. visceralis
- (2) Nuc. salivatorius superior
- (3) Nuc. salivatorius inferior
- (4) Nuc. dorsalis nervi vagi

Postganglionik PS nöronların bulunduğu ganglionlar

Hedef organ



M. sphincter pupilla, m. ciliaris

Gl. lacrimalis

Gl. submandibularis, gl. sublingualis

Gl. parotidea

Thorax organları, pancreas, dalak, karaciğer, safra kesesi, özofagus, mide, ince bağırsak, flexura coli sinistra'ya kadar olan kalın bağırsaklar

Colon descendens
Colon sigmoideum
Rectum
Canalis analis
Tüm pelvik organlar